



Amblyomma sculptum

Ciclo de vida



DISTRIBUCIÓN

Esta garrapata se distribuye en Selva pedemontana de transición y Montaña de las Yungas en las provincias de Salta y Jujuy, el Chaco Húmedo, delta del Paraná, bosques de albardones del Chaco Semiárido de las provincias de Formosa, Chaco y Salta, noroeste de Corrientes y noreste de Santa Fe.



RECOMENDACIONES

Estas medidas ayudarán a minimizar el riesgo de exposición a las garrapatas:

1. Manténgase siempre dentro de los senderos y sectores autorizados para visitantes.
2. Utilice vestimenta adecuada: elija ropa clara, que cubra brazos y piernas, preferentemente ajustada en los extremos para evitar el ingreso de garrapatas.
3. Aplique repelente: use repelente en la piel expuesta y también sobre la ropa para una mayor protección.
4. Revise su cuerpo con frecuencia: inspeccione cuidadosamente para identificar y remover cualquier garrapata adherida a la piel lo antes posible.

En caso de FIEBRE dentro de los CINCO (5) días posteriores a una picadura de garrapata o de haber visitado un sitio con presencia de garrapatas, acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

ESCRÍBENOS O LLAMA A:

+54 9 3874 13-6046



@parquenacionalelrey

linktr.ee/PARQUENACIONALELREY_1948

parquenacionalelrey@apn.gob.ar

PARQUE NACIONAL EL REY

Administración de Parques Nacionales

GARRAPATAS



I I B Y T
CONICET
U N C

CONICET
I D I C A L



Recuerde que usted visitará un ambiente natural de Selva Subtropical de Montaña, en donde algunos de sus componentes silvestres pueden representar un riesgo para la integridad física de las personas si no se adoptan las precauciones necesarias.

¿QUÉ SON LAS GARRAPATAS?

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos parientes de las arañas (pertenecen al phylum Arthropoda y clase Arachnida) y parasitan a anfibios, reptiles, aves y mamíferos (vertebrados tetrápodos). Se encuentran entre los vectores de microorganismos patógenos (ej. virus, bacterias, protozoos) de mayor relevancia médica y veterinaria.


¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS?

Son aquellas causadas por bacterias, virus o protozoos que se transmiten de los animales a las personas por la picadura de una garrapata infectada.

CICLO DE VIDA DE LAS GARRAPATAS

Los ciclos biológicos de las garrapatas están compuestos por dos fases: una fase parasitaria, y una fase de vida libre o no parasitaria (el 90% en la vida de una garrapata y por lo general se encuentra en la vegetación).

El ciclo de vida comprende huevos, larvas, ninfas y adultos. Todas las especies presentes en el PN El Rey tienen un ciclo de vida de tres hospedadores. Esto quiere decir que, larvas, ninfas y adultos se alimentan sobre diferentes individuos hospedadores que pueden o no pertenecer a diferentes especies.



GARRAPATAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE NACIONAL EL REY

En el PN El Rey se ha confirmado la presencia de diversas especies de garrapatas como *Amblyomma hadanii*, *Amblyomma neumannii*, *Amblyomma sculptum*, *Haemaphysalis juxtakochi*, *Haemaphysalis leporispalustris*, *Ixodes parvicinus*, *Ixodes silvanus*, *Ixodes luciae* e *Ixodes longiscutatus*. Solo las especies de *Amblyomma* y *H. juxtakochi* parasitan a humanos.

Amblyomma sculptum

A. sculptum es la especie de mayor relevancia sanitaria. Es nativa de Sudamérica, es generalista (mamíferos y aves) y se ha adaptado a parasitar animales domésticos, sobre todo bovinos y equinos.

Es muy agresiva hacia los seres humanos y el vector biológico de *Rickettsia rickettsii* una bacteria que causa la FIEBRE MANCHADA grave en humanos. Esta enfermedad es de alta letalidad, pero con baja prevalencia, siendo la región de las Yungas en las provincias de Salta y Jujuy el área en donde se han reportado los casos en humanos.



Hembra



Macho

Ninfa



Las ninfas se encuentran en gran cantidad y principalmente en primavera. Dado su menor tamaño, en comparación con los adultos, es el estadio que más picaduras produce. Además, es el estadio con mayores tasas de infección por *R. rickettsii* y por lo tanto el de mayor importancia en la transmisión de la FIEBRE MANCHADA.

Amblyomma neumannii

Habita el Chaco semiárido y zonas de transición entre este y las Yungas. El rostro es más corto y robusto que en las otras de *Amblyomma*.



Hembra



Macho

Amblyomma hadanii

Esta especie habita la Selva Montana y Bosque Nublado de las Yungas Argentinas. Si bien es parecida a *A. sculptum* los patrones de dibujos dorados en su escudo son diferentes siendo incluso de mayor tamaño.



Hembra



Macho

Haemaphysalis juxtakochi

En Argentina, tiene una distribución muy amplia que abarca diferentes regiones biogeográficas del país. No tienen dibujo dorado en su escudo dorsal y su rostro es corto y de forma triangular.



Hembra



Macho

Diferencia de tamaño de ninfas

1. *Haemaphysalis juxtakochi*
2. *Amblyomma hadanii*
3. *Amblyomma neumanni*
4. *Amblyomma sculptum*

